

Kính gửi thầy/cô phản biện!

Em xin chân thành cảm ơn những góp ý của thầy/cô đã giúp cho bài báo của em được hoàn thiện hơn. Em đã chỉnh sửa và bổ sung các nội dung theo yêu cầu của thầy/cô.

Em cũng xin có một số phản hồi như sau:

1. Trong cùng điều kiện nuôi cấy đồng nhất (nhiệt độ, ánh sáng, tốc độ sục khí), đồng thời tỷ lệ giữa các nguồn C:N:P của các môi trường là tương đồng nhau có thể góp phần làm cho tảo đạt sinh khối tối đa cùng thời điểm. Bên cạnh đó, ở ngày nuôi thứ 20, pH các loại môi trường đều tăng cao ($\text{pH} > 10$) nên làm cho tốc độ sinh trưởng của tảo bị chậm lại ở cùng thời điểm này.
2. Tất cả các nghiệm thức ở thí nghiệm 1 và 2 được tiến hành đồng thời (khảo sát các loại môi trường khác nhau hòa tan trong các loại dung môi khác nhau). Ở thí nghiệm 1 so sánh các loại môi trường M1, M2, M3, M4 để chọn ra môi trường thích hợp (M3). Ở thí nghiệm 2 tiếp tục so sánh môi trường M3 và M3' để chọn ra dung môi thích hợp. Do vậy, các số liệu của môi trường M3 ở thí nghiệm 1 cũng chính là môi trường M3 ở thí nghiệm 2.